

AIP 2011

L'influenza dell'attaccamento e della sensibilità diadica genitoriale sullo sviluppo psicomotorio del bambino nato pretermine

Franco Baldoni¹, Elisa Facondini¹, Mattia Minghetti¹, Nicola Romeo², Loredana Cena³, Andrea Landini¹, Patricia Crittenden⁴

¹ Attachment Assessment Lab, Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna.

² Unità Intensiva Neonatale, AUSL Rimini, Ospedale Infermi, Rimini

³ Facoltà di Medicina, Università di Brescia.

⁴ Family Relations Institute, Miami, FL, USA

In: Atti XIII Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica dell'Associazione Italiana di Psicologia (AIP) (Catania 16-18 Settembre 2011), Express, Torino, p. 267 (ISBN 978-88-97412-229).

Abstract

Lo scopo di questa ricerca è studiare i precursori dell'attaccamento e la sensibilità diadica genitoriale nelle famiglie con bambino nato pretermine.

Sono state considerate 110 famiglie delle quali 55 con figli nati pretermine (peso alla nascita \leq 1500 gr.) per un totale di 330 soggetti valutati durante i primi sei mesi di età corretta del bambino. Le diadi madre-bambino e padre-bambino sono state sottoposte al CARE-Index, una procedura videoregistrata per la valutazione dei precursori dell'attaccamento; ad entrambi i genitori sono stati somministrati CES-D, per la valutazione della depressione e STAI Y-2, per la valutazione dell'ansia di tratto. Lo sviluppo psicomotorio dei neonati è stato valutato tramite le scale Bayley. Rispetto ai controlli, nelle madri dei bambini pretermine sono stati evidenziati bassi punteggi di Sensibilità Diadica al CARE-Index ($p=.025$) ed elevati livelli di ansia ($p=.026$). Nei padri sono stati riscontrati bassi punteggi di Sensibilità Diadica ($p=.004$) e alti livelli di sintomi depressivi ($p=.003$). Nelle famiglie pretermine i precursori dell'attaccamento sono più frequentemente di tipo insicuro nelle madri ($p=.000$) e nei padri ($p=.000$), mentre nei neonati solo nell'interazione con la madre ($p=.012$). Questi fattori sono risultati associati a minori punteggi alle scale Bayley ($p=.000$). Nelle madri dei neonati pretermine si riscontrano frequenti difficoltà con la famiglia di origine, nei padri una percezione negativa del proprio bambino e una maggiore insoddisfazione per l'assistenza ricevuta.

Questi risultati evidenziano che il 40% delle madri e il 75% dei padri dei bambini nati pretermine rientra nella fascia ad alto rischio del CARE-Index (che richiede un trattamento psicologico e/o farmacologico). In tali casi, la scarsa sensibilità diadica, i precursori di attaccamento insicuro e le difficoltà psicologiche dei genitori sembrano influenzare lo sviluppo psicomotorio del bambino.